

Neosoro

cloreto de sódio
cloreto de benzalcônio
cloridrato de nafazolina

Forma farmacêutica e apresentação

Solução nasal - embalagem com 01 frasco contendo 30mL.

USO ADULTO

Composição

Cada mL da solução nasal contém:

cloreto de sódio

.....
.....9,0 mg

cloreto de

benzalcônio.....

.....0,1 mg

cloridrato de

nafazolina.....

.....0,5 mg

água destilada

q.s.p.....

.....1 mL

Informações ao Paciente

A ação esperada do produto é de promover a anti-sepsia e a descongestão nasal.

Conservar em temperatura ambiente controlada (15 a 30 C).

Proteger da luz. -Prazo de validade: VIDE CARTUCHO. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido, poderá ocorrer diminuição significativa do seu efeito terapêutico.

“Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término.”

-“Informe seu médico se está amamentando.”

“Siga as orientações do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.”

O tratamento pode ser interrompido a qualquer momento sem causar danos ao paciente.

A ocorrência de reações adversas são raras, podendo ocorrer irritação local. “Informe seu médico o aparecimento de quaisquer reações desagradáveis durante o tratamento.”

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”

O uso deste produto é contra-indicado em crianças menores de

6 anos.

Não exceder à dose recomendada. Como outros descongestionantes nasais contendo vasoconstritores, o uso prolongado pode conduzir à congestão nasal de rebote.

Até o momento, não foi observada nenhuma evidência de interação medicamentosa com o Neosoro.

Os frascos de Neosoro devem ser utilizados por apenas uma pessoa, a fim de evitar disseminação de infecções.

“Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando antes do início ou durante o tratamento.”

“NÃO TOME MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE”.

Informações Técnicas

O cloreto de benzalcônio é tensoativo iônico do grupo dos compostos de amônio quaternário. Sua atividade anti-séptica se deve à desnaturação ou coagulação das proteínas bacterianas. É ativo contra bactérias gram-positivas, gram-negativas e alguns fungos. O cloridrato de nafazolina é uma amina simpatomimética derivada da imidazolina, atuando pela estimulação dos receptores alfaadrenérgicos da musculatura lisa vascular, causando vasoconstrição, descongestão nasal e efeitos pressores. O início da ação da nafazolina ocorre em cerca de 10 minutos após aplicada e perduram por 2 a 6 horas. O cloreto de sódio desempenha uma ação fundamental na manutenção da tensão osmótica do sangue e tecidos.

Indicações

Como anti-séptico e descongestionante nasal.

Contra-Indicação

ESTÁ CONTRA-INDICADO A PACIENTES COM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE AO CLORETO DE BENZALCÔNIO E/OU A NAFAZOLINA. CONTRAINDICADO EM CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS.

Precauções

Deve ser usado com cautela em pacientes portadores de cardiopatias e hipertireoidismo.

O uso prolongado pode conduzir à congestão nasal de rebote.

Interações Medicamentosas

Não existe evidência suficiente que confirme a ocorrência de interações clinicamente relevantes.

Reações Adversas

Não foram encontrados relatos específicos de reações adversas

causadas em usuários do produto.

ALTERAÇÕES EM EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS
Não há relatos de alterações causadas com o Neosoro.

Posologia

Instilar 2 a 4 gotas em cada narina, 4 a 6 vezes ao dia.

Superdose

Não há relato de casos de superdose em adulto. A aplicação excessiva na mucosa nasal ou ingestão do produto por crianças pode causar cefaléia, hipertensão e isquemia de órgãos vitais possivelmente seguidas por efeitos secundários. O paciente deve ser encaminhado ao serviço médico o mais rápido possível.

Pacientes Idosos

O uso em pacientes idosos (acima de 60 anos) requer prescrição e acompanhamento médico.

LAB. NEO QUÍMICA COM. E IND. LTDA.

Rua VPR 1, Quadra 2-A, Mód. 4

Anápolis/GO - CEP: 75133600

Tel: (62)316-1055

Fax: (62)316-1022